AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique

Abonnement annuel

D.D.A. du Nord

Regisseur de Recettes

C.C.P. 5704-01 W Lille

115,00 F.

Edition de la Station Nord - Pas-de-Calais - Picardie

Tilloy-les-Mofflaines - B.P. 29 - 62217 BEAURAINS - Tél. (21) 59.99.35

Siège de la circonscription

Cité administrative - 59048 Lille cedex - Tél. (20) 52.00.25

Antenne régionale picarde : (Somme et Oise), 56, rue Jules-Barni - 80040 Amiens - Tél. (22) 92.51.27

(Aisne) Cité administrative - 02016 Laon - Tél. (23) 23.00.41

Permanence les lundi, mercredi et vendredi matin

SPECIAL NORD PAS-DE-CALAIS

BULLETIN TECHNIQUE n° 11 du 15 MAI 1984

BLES D'HIUER

situation

Stade 2 noeuds à apparition de la dernière feuille . La septoriose est importante sur F, et F3.

preconisations

(RAPPEL)

Sur parcelles protégées entre le premier et le deuxième noeud, aucune intervention ne se justifie.

Sur parcelles non protégées à 2 noeuds, traitez avec une spécialité efficace sur septoriose (par exemple B.M.C. + manèbe, B.M.C. + manèbe + soufre).

ESCOURGEONS - ORGES D'HIUER

situation

En cours d'épiaison, légère progression de l'helminthosporiose avec risque de développement par temps doux et humide.

preconisations

Dans de nombreux cas (parcelles protégées depuis plus de 20 jours), envisagez une INTERVENTION CONTRE L'HELMINTHOSPORIOSE avec des spécialités à base de propiconazole (TILT C ou SP), de prochloraz (SPORTAK PF ou SPORTAK + mancozèbe).

BETTERAUES

situation

Levée difficile des derniers semis (ou resemis). Localement, attaques de ravageurs souterrains (blaniules, scutigerelles).

preconisations

Aucune solution de rattrapage n'est réellement satisfaisante sur attaques de blaniules et scutigerelles. Une application de KREGAN ou LORSBAN à 3,5 Kg/Ha peut toutefois se tenter avec un binage (en évitant de blesser les betteraves).

POIS ET FEVEROLES

Intensification des attaques de sitones.

COLZA

Attention au Sclérotinia sur les parcelles à risque, à la chute des pétales.

MESSELIERE la Ch

P.164

POMMES DE TERRE

situation et preconisations

Premières levées. Profitez du sol frais après pluies pour désherber.

strategie mildiou

DETECTION DES SOURCES PRIMAIRES D'INFECTION

Il est indispensable de connaître rapidement la localisation et l'importance des premières taches de MILDIOU SUR DECHETS et REPOUSSES ET PLEIN CHAMP pour définir les risques de la campagne (en 1983, premières taches sur parcelles en cours de levée) et confronter la réalité avec les calculs prévisionnels théoriques.

UN CONCOURS POUR LA DETECTION DE CES TACHES EST OUVERT A TOUS : AGRICULTEURS OU PARTICULIERS DES DEPARTEMENTS DU NORD, DU PAS-de-CALAIS, DE LA SOMME, DE L'AISNE ET DE L'OISE.

Dans chacune des zones de production des 5 départements cités plus haut, des prix récompenseront les permières personnes qui nous auront adressé une tache de mildiou.

Toute personne participant au concours devra prélever les feuilles ou tiges portant la tache imputée à une attaque de mildiou. Envoyer cet échantillon pour vérification entre deux buvards légèrement humides placés sous enveloppe adressée rapidement à :

- STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES B.P. 29 - TILLOY LES MOFFLAINES 62217 BEAURAINS

Joindre la fiche de renseignements ci-après. Il est évident que la destruction des tas de déchets et repousses doit être réalisée aussi tôt que possible.

FICHE DE RENSEIGNEMENT	S	
<u>NOM</u> : <u>PRENOM</u> :		
<u>ADRESSE</u> :		
Tél. :		
COMMUNE OU EST SITUEE LA CULTURE ET LOCALIS	ATION DE LA PARCELLE :	
S'agit-il de : repousses en cultures	tas de déchets [)
jardin	plein champ	
Variété : Date de levée	. :	
Situation de la parcelle : Plaine	Cuvette	,
Plateau	Coteau)
Situation des premières taches :	her same a meet afficial fail.	
Attaques de tiges sur feuilles du milieu	sur feuilles basses sur feuilles du sommet	(1,
Importance de l'attaque au moment de la déc	ouverte :	
Une tache	Plusieurs taches	(1)
Sur un pied	sur plusieurs pieds	
Date de la découverte :	spondante(s).	